ня може бути змінено. Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Перед застосуванням слід проконсультуватися з лікарем.
Добавку дієтичну не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Протипоказання: індивідуальна чутливість до окремих компонентів, вагітність та період лактації, ниркова недостатність, діти віком до 18 років.

Не є лікарським засобом.

Умови зберігання та термін придатності: зберігати в упаковці виробника, за температури до від 2°С до 25 °С у захищеному від попадання прямих сонячних променів місці, при відносній вологості повітря не вище за 75%. Зберігати у недоступному для дітей місці. Строк придатності 36 місяців з дати виробництва.

Термін придатності: 3 роки з дати виробництва.

Пакування: пакетики саше по 3 g (г) ±9,0%, по 2-90 штук в картонній пачці.

Кінцева дата споживання "Вжити до" або дата виробництва та строк придатності, номер партії (серії) виробництва: вказано на упаковці.

Виробник: ПП «МСК-МЕД», Україна, 04060, м. Київ, вул. Подвойського, 11-А, кв. 11 на замовлення ТОВ «ЕВОКЕАР».

Адреса виробничих потужностей: Київська обл., смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 215.

Дистриб'ютор та оператор ринку відповідальний за маркування: ТОВ «ЕВОКЕАР» Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 74Б, офіс 11; Тел.: +380966981828; e-mail: m.gurkin@evocare.com.ua; код ЄДРПОУ: 44930821

ТУ У 10.8-44930821-001:2024

EVOSITOL

ЕВОЗІТОЛ

evocare

ISO 22000 НАССР

ДІЄТИЧНА ДОБАВКА

Склад (на 1 саше): вітамін В8 (міо-інозитол) – 2000 mg (мг); L-метилфолат кальцію – 400 µg (мкг); вітамін D3 (холекальциферол) – 10 µg (мкг); *допоміжні речовини:* еритрол; кислота лимонна; ароматизатор «Лимон».
Без ГМО.

Міо-інозитол – один з ендогенних метаболітів людини, що чинить істотний вплив на функціонування всіх тканин. Він нормалізує функціонування рецепторів інсуліну, репродуктивних гормонів та надає позитивний вплив на репродуктивну функцію, відновлення регулярності менструального циклу та овуляції природним шляхом, позитивно впливає на підвищення фертильності. Міо-інозитол бере участь у регуляції жирового обміну, нормалізує рівень холестерину в крові, перешкоджає розвитку атеросклерозу та ожиріння, сприяє зниженню інсулінорезистентності та гіперінсулінемії, сприяє усуненню проблем зі шкірою, таких як акне, себорея та гірсутизм (надлишкове оволосіння за чоловічим типом). Міо-інозитол є важливим синергістом фолатів та інших вітамінів, а також мінералів. Застосування міо-інозитолу, особливо в поєднанні з фолатами та вітаміном D3 є ефективним способом корекції репродуктивних і соматичних порушень.

L-метилфолат володіє більш високою біодоступністю на відміну від фолієвої кислоти, це її біологічно активна форма. L-метилфолат відіграє важливу роль у метаболізмі амінокислот, синтезі білка та нуклеїнових кислот, у створенні нових клітин, включаючи ооцити, сприяє нормалізації гормонального фону, відновленню фертильної функції у жінок, корегуванню різних патологічних станів при синдромі полікістозних яєчників.

Вітамін D3 – один із основних елементів біохімічних процесів нервової, кровоносної та опорно-рухової систем організму. Він грає ключову роль в кальцієво-фосфорному обміні і впливає на мінеральну щільність кісток, тому необхідний для здоров'я кісткової тканини особливо у період вікового її потоншання, допомагаючи попередити переломи. Вітамін D3 важливий для підтримання здорового стану зубів та міцності нігтів, а також сприяє загальному покращенню самопочуття, підтриманню тонусу м'язів та позитивного настрою, особливо у період недостатності сонячного світла. Додаткове застосування вітаміну D3 дає змогу гармонізувати роботу ендокринної й репродуктивної систем.

Рекомендації щодо споживання: дієтична добавка до раціону харчування, як додаткове джерело міо-інозитолу, вітаміну D3 та метилфолату для загального зміцнення організму жінок, нормалізації вуглеводного та жирового обміну речовин, рівню глюкози та холестерину в крові, підтримки гормонального балансу, нормалізації функціонування репродуктивної системи жінки, нормалізації менструального циклу і овуляції, покращення фертильності у жінок, а також зниженню індексу інсулінорезистентності, покращення психоемоційного стану.

Спосіб застосування: дорослим по 1 саше 1 раз на день після вживання їжі. Вміст саше розчинити у 200-250 ml (мл) води кімнатної температури, ретельно розмішати та випити одразу після приготування. За призначенням лікаря дози та термін вживан-